



FRONTIER FLOW

PROBIOTICO
Inoculo di funghi micorrizici

Contenuto in funghi micorrize 1%

Glomus intraradices, Glomus mosseae

Beauveria bassiana 1×10^7 CFU/gr; Metarhizium Anisopliae 1×10^7 CFU/gr

Contenuto in batteri della rizosfera (Bacillus spp) 1×10^8 CFU/gr

Estratto vegetale PRE-BIOTICO

Attività

FRONTIER FLOW è un prodotto a base di micorrize e microrganismi antagonisti con sostanze PREBIOTICHE che favoriscono una rapida colonizzazione della rizosfera da parte del Microbioma utile. Le micorrize aumentano lo sviluppo radicale e garantiscono una maggior assorbimento dei nutrienti minerali.

I batteri appartenente al genere Bacillus e Pseudomonas presenti nel prodotto, stimolano la resistenza indotta (ISR) della pianta e competano per spazi e nutrienti con microrganismi tellurici dannosi e aumento l'assorbimento dei nutrienti migliorando la produzione di sostanze promotori del metabolismo.

- ✓ Migliora l'equilibrio radice – suolo aumentando l'assorbimento
- ✓ Favorisce lo sviluppo di un MICROBIOMA antagonista di insetti dannosi
- ✓ Incrementa la resistenza indotta (ISR) agli stress abiotici/biotici

FRONTIER FLOW grazie alle sostanze **PREBIOTICHE di origine vegetale** contenute nel formulato favorisce lo sviluppo di **Metarhizium anisopliae** ed **Beauveria bassiana** i quali attraverso meccanismi specifici come la produzione di specifiche tossine e la secrezione di enzimi idrolitici permette alla pianta di essere più resistente e tollerante nei confronti di stress biotici causati da insetti quali coleotteri, ditteri, omotteri, lepidotteri ed elateridi.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Su tutte le colture frutticole, orticole, floricole e ornamentali . Applicare il prodotto con volumi di acqua sufficienti ad ottenere una copertura completa ed uniforme. Applicare il prodotto preferibilmente nelle ore più fresche della giornata quando l'umidità relativa è più elevata.



COLTURE



DOSAGGIO



PERIODO DI APPLICAZIONE

COLTURE	DOSAGGIO	PERIODO DI APPLICAZIONE
applicazione al terreno	2-3 lt/ha In fertirrigazione avendo cura di bagnare la superficie interessata	1° Pre-semina, Pre-trapianto; 2° Ripetere 2-3 volte ogni 10/15 gg dopo l'emergenza o trapianto
applicazione fogliare	200-400ml/hl	Preventivamente per ridurre lo stress e in funzione dell'andamento climatico

Rispettare intervalli brevi tra un applicazione e l'altra. Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti in commercio ad eccezione dei prodotti contenuti fosforo effettuare comunque sempre saggi preliminari su piccole superfici prima dell'impiego.



Vivo è un marchio:

RAGGIOVERDE s.r.l.

Via della Pace, 22 - Roccapiemonte (Sa) Italy

www.raggioverdeweb.it - info@raggioverdeweb.it



Confezioni: 1-5 Kg