



ELICIN BZ

Promotore delle difese naturali



FORMULATO INNOVATIVO CHE PREVENIENE LE CARENZE DI BORO E ZINCO E MIGLIORARE LA RESISTENZA A STRESS ABIOTICI E BIOTICI GRAZIE ALLA PRESENZA DI OLIGOSACCARIDI NATURALI COME GLI ACIDI CARBOSILICI.

Un utilizzo regolare favorisce uno sviluppo sano ed equilibrato delle piante trattate migliorando le caratteristiche qualitative delle produzioni.

AZIONE

- Attiva il sistema immunitario vegetale (S.A.R)
- "Effetto Vaccino": maggior accumulo di proteine di difesa
- Rapidità d'azione maggiore velocità

COMPOSIZIONE

Miscela di microelementi fluida

Boro (B) solubile in acqua 0,2 %

Zinco (Zn) solubile in acqua 1,8 %

Agente complessante HGA Acido Heptagluconico

DOSI E MODALITÀ D'USO

Componenti: oligosaccaridi, acidi carbossilici, microelementi essenziali

 COLTURE	 FOGLIARE	 PERIODO DI APPLICAZIONE
 Drupacee Pomacee	200-250 ml/hl	Dall'allegagione ogni 10 gg, durante la crescita del frutto secondo esigenza
 Orticole a frutto	200-250 ml/hl	Applicare settimanalmente, secondo esigenza, garantendo una buona bagnatura
 Orticole a foglia	200-250 ml/hl	Applicare settimanalmente, secondo esigenza garantendo una buona bagnatura
 Kiwi	200-250 ml/hl	Da gemme mosse ripetere fino all'allegagione ogni 10 giorni, accrescimento frutto
 Frutta a Guscio (Nocciolo-Castagno)	200-250 ml/hl	Da frutto visibile fino a indurimento guscio, ogni 10-15 gg
 Olivo	200-250 ml/hl	Prefioritura, allegagione, accrescimenti frutto
 Vite	200-250 ml/hl	Applicare da grappoli separati alla chiusura grappolo, ogni 10-12 gg
Tutte le colture, in fertirrigazione	1-1,5 lt/ha	Nei periodi di maggior fabbisogno

