



SUBELUS®

Fungicida microbiologico



FUNGICIDA MICROBIOLOGICO A BASE DI UN NUOVO CEPPLO DI BACILLUS SUBTILIS IAB/BS03, SOLUZIONE NATURALE CONTRO OIDIO, PERONOSPORA E TICCHIALATURA CON EFFETTO PREVENTIVO E CURATIVO E SENZA RISCHIO DI GENERARE RESISTENZA.

Offre un'azione multi-target efficace contro i patogeni senza indurre resistenze, ed è sicuro per gli insetti utili e l'agricoltura biologica. Con un intervallo di sicurezza di un solo giorno e un'alta compatibilità con altri fitosanitari, assicura flessibilità d'uso. La formulazione TECAPS garantisce stabilità nel tempo, mentre il meccanismo d'azione combina metaboliti antimicrobici, competizione per lo spazio e attivazione delle difese della pianta.

AZIONE

- Produzione di metaboliti antimicrobici
- Competizione per spazio e nutrienti
- Attivazione del sistema di autodifesa

COMPOSIZIONE

Bacillus subtilis CEPPLO IAB/BS03 (1x10 UFC/g) coiduvanti q.b.

NUMERO DI REGISTRAZIONE 18008 del 09-03-2022 del Ministero della Salute

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile

VANTAGGI

- Ampio spettro d'azione, con attività multi-target
- Non induce resistenza nel patogeno
- Innocuo per gli insetti utili ed autorizzato in agricoltura biologica
- Intervallo di sicurezza di un (1) solo giorno pre raccolta
- Elevata compatibilità con Fitosanitari, anche rame e zolfo
- Formulazione, TECAPS su base solida, con alta stabilità nel tempo

DOSI E MODALITÀ D'USO

Miscela di microrganismi benefici, metaboliti antimicrobici naturali, induttori di resistenza sistemica (SAR)

 COLTURE	 AVVERSITÀ	 DOSAGGIO	 N° MASSIMO APPLICAZIONI	 PERIODO DI APPLICAZIONE
 Cetriolo, Zucchine e altre cucurbitacee con buccia commestibile (in serra)	Oidio (Mal bianco)	0.5 - 1.5	5*	Dalla 7ª foglia vera sino alla raccolta
 Mele, Pere, Cotogne, Nespole, Pere (nashi), Mela selvatica	Ticchiolatura (Venturia inaequalis)	0.5 - 1.5	8**	Dalla fase orecchiette di topo all'allegagione
 Lattuga, Cicoria, Scarola, Indivia riccia, Dolcetta, Rucola e altre insalate (pieno campo)	Peronospora	0.4 - 1.2	5	Dall'inizio dello sviluppo vegetativo al raggiungimento del 60% della dimensione finale

(*) Applicazione preventiva. Le applicazioni devono essere effettuate di sera per garantire un periodo più lungo di elevata umidità.

(**) Applicare già dalla prefioritura con intervallo di 10 giorni, quindi effettuare 6 applicazioni dopo la fioritura a intervalli di 7-14 giorni.

