

INOCULO MICORRIZICO CON CEPPLO DI TRICODERMA HARZIANUM I.A.B. ATTIVATO CON UN AMMENDANTE ORGANICO VEGETALE PREBIOTICO.

Un formulato appositamente studiato per migliorare le caratteristiche del suolo e l'equilibrio vegeto-produttive delle piante, ottenuto tramite un procedimento di liofilizzazione e miscelazione con elevati standard produttivi per garantire la massima efficacia, un'ottimale solubilizzazione e distribuzione con le tradizionali attrezzature per irrigazione e di irrorazione per applicazione localizzata. La componente principale è data dal Trichoderma harzianum che colonizza la superficie radicale, stimola lo sviluppo della pianta, grazie alla elevata emissione di fattori di crescita, che sono facilmente assorbiti dalle radici aumentando la resistenza delle radici ad avversità terricole.

AZIONE

- Maggiore sviluppo radicale ed esplorazione del suolo
- Maggior resistenza della pianta a stress abiotico
- Colonizzazione delle nicchie ecologiche (riduzione spazi per microrganismi dannosi)

COMPOSIZIONE

Inoculo di funghi micorrizici

Contenuto in micorrize.....	0,1%
Contenuto in batteri della rizosfera	1×10^5 UFC/gr
Contenuto in Trichoderma harzianum	1×10^7 UFC/gr

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Componenti: contenuto in micorrize, contenuto in batteri della rizosfera, contenuto in trichoderma harzianum

 COLTURE	 FERTIRRIGAZIONE	 PERIODO DI APPLICAZIONE
 Drupacee	0,5-1 kg/ha	Da effettuarsi al momento dell'impianto. Da ripetersi 2-3 volte a distanza di 20-21 giorni
 Pomacee	0,5-1 kg/ha	
 Actinidia Vite	0,5-1 kg/ha	
 Orticole	0,5 kg/ha	Post trapianto, localizzato in fertirrigazione ripetere 2 volte in 20 gg
 Fragola	0,5-0,8 kg/ha	Post trapianto, localizzato in fertirrigazione ripetere 2 volte in 20 gg
 Preparazione substrati	200 gr/m ³	Se necessario ripetere l'intervento dopo 15-21 giorni dalla semina o trapianto
 Piantine in vivaio	100 gr / 10.000 alveoli	Se necessario ripetere l'intervento dopo 15-21 giorni dalla semina o trapianto

